

オピオイド換算表

注)小数点以下切り捨て

投与方法	商品名	採用規格	薬価 ^{注)}	定期投与 オピオイド換算の目安						
内服	トラマールOD錠	25mg、50mg	38 67		100mg		200mg	300mg		
	タペンタ錠	25mg、50mg、100mg	108 206 391	50mg		100mg		200mg	300mg	400mg
	オプソ内服液	5mg/2.5mL、10mg/5mL	121 224	15mg	20mg	30mg	40mg	60mg	90mg	120mg
	モルヒネ末		2203/g							
	ピーガード錠	20mg、30mg	512 745							
坐薬	アンパック坐剤	10mg、20mg	322 612			15mg		30mg	45mg	60mg
注射	モルヒネ注	10mg・1mL/A 50mg・5mL/A 200mg・5mL/A	299 1346 4973			~20mg		20~30mg	30~40mg	40~60mg
内服	オキノーム散	2.5mg、5mg	67 134	10mg		20mg		40mg	60mg	80mg
	オキシコンチン錠	5mg、10mg 20mg、40mg	144 270 502 923							
注射	オキファスト注	10mg・1mL/A 50mg・5mL/A	362 1655	7.5mg		15mg		30mg	45mg	60mg
貼付	フェントステープ	1mg、2mg 4mg、8mg	586 1094 2039 3800			1mg		2mg	3mg	4mg
注射	フェンタニル注	0.1mg・2mL/A	225			~0.3mg	~	0.4~0.6mg	0.6~0.8mg	0.8~1.2mg
レスキュー				上記投与中のレスキュー量の目安						
内服	オプソ	5mg・2.5mL/包、10mg・5mL/包				5mg		10mg	15mg	20mg
坐薬	アンパック	10mg、20mg						5mg		10mg
注射	モルヒネ注	10mg/1mL、50mg/5mL、200mg/5mL				1mg		3mg	5mg	6mg
内服	オキノーム	2.5mg (0.5g) /包、5mg (1g) /包		2.5mg		2.5~5mg		5~10mg	10mg	15mg
注射	オキファスト注	10mg・1mL/A、50mg・1mL/A						5~7.5mg	7.5mg	10~12.5mg
	フェンタニル注	0.1mg・2mL/A				0.05mg		0.1mg	0.1mg	0.15mg

内服:坐薬:注射(皮下・静脈):硬膜外=1:1/2:1/3~1/2:1/15~1/20

持続静注・持続皮下注投与のレスキューは定期投与の1時間分を早送り